

HOT TOPIC

Fütterung der wählerischen Katze



Im Fokus

Wählerische Katzen zum Fressen zu bewegen, kann für Tierärzte und Tierhalter gleichermaßen frustrierend sein. Die Behandlung von Krankheiten und Stress sowie die Umsetzung von Strategien zur Verbesserung der Nahrungsaufnahme können wählerischen Katzen helfen, ihren Energie- und Nährstoffbedarf zu decken. Diese Strategien gelten sowohl für Katzen in der Tierklinik als auch für Katzen in der häuslichen Umgebung.

Das Purina Institute liefert die wissenschaftlichen Fakten zur Untermauerung Ihrer Gespräche über Ernährung.

let's
takeback
the conversation.

Erfahren Sie mehr über die große Bedeutung der Ernährung bei [PurinaInstitute.com](https://www.purina.com)

Medizinisches Management von Appetitlosigkeit

Die Nahrungsaufnahme sollte in der Klinik von den Tierärzten und zu Hause von den Tierhaltern überwacht werden. Wenn der Energiebedarf nicht gedeckt wird, sollte die Katze auf medizinische Ursachen für Anorexie oder Hyporexie untersucht werden. Wenn die Ursache für die Inappetenz bekannt ist, sollte sie behandelt werden. Inappetenz kann jedoch ein vages Anzeichen ohne bekannte Ursachen sein. In diesen Fällen sollten gleichzeitige klinische Anzeichen behandelt werden. ¹

Diese umfassen:

- Übelkeit
- Schmerz
- Gastrointestinale Dysmotilität

Wenn die medizinische Behandlung der klinischen Symptome nicht ausreicht, um die Nahrungsaufnahme einzuleiten, sollten Verhaltensstrategien eingesetzt werden.

Verhaltensorientierte Strategien zur Verbesserung der Nahrungsaufnahme

Die Reduzierung von Stressfaktoren kann auch die Nahrungsaufnahme verbessern.² Wenn die Katze sich nicht wohl fühlt oder gestresst ist, ist es oft notwendig, ein komplettes und ausgewogenes, hoch schmackhaftes, hoch verdauliches und energiereiches Futter zu verwenden, das nicht dauerhaft verwendet wird und das nicht das Lieblingsfutter der Katze ist. Vermeiden Sie die Einführung einer therapeutischen oder neuen Diät, wenn eine Futtermittelabneigung wahrscheinlich ist, nachdem ein erheblicher Stressfaktor beseitigt wurde oder das Tier aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Dies gilt auch für Harn- und Nierendäten.

Andere Verhaltensstrategien, die die Nahrungsaufnahme erhöhen können:


- Für Katzen, die in der Tierklinik liegen, sollte der Besitzer etwas von zu Hause mitbringen, das nach etwas Vertrautem riecht, um die Katze zu beruhigen.
- Wenn die Katze langfristig eine neue Nahrung zu sich nehmen muss, sollte man sie in einer angenehmen Umgebung an die neue Nahrung gewöhnen. Manche Katzen brauchen eine langsamere Umstellung, z. B. 4 Wochen, während andere die neue Ernährung leichter akzeptieren und eine schnellere Umstellung möglich ist. Bei langfristigen Ernährungsumstellungen wird nicht empfohlen, Katzen schneller als innerhalb von sieben Tagen umzustellen.
- Bieten Sie mehr als einen Futternapf an (auch mit demselben Futter).
- Legen Sie einen festen Endpunkt für die Essenszeiten fest, um nicht ständigen Lebensmittelgerüchen ausgesetzt zu sein.
- Bieten Sie eine Vielzahl von Lebensmitteln und neue Lebensmittel an, wenn möglich, um den Appetit zu steigern. Dazu gehören verschiedene Formen und Arten von Lebensmitteln. Diese Strategie kann in einem positiven Umfeld erfolgreich sein.
- Fügen Sie einer therapeutischen Diät etwas Schmackhaftes hinzu, z. B. eine kleine Menge an akzeptablem und schmackhaftem Futter, schmackhafte Probiotika, aromatisierte Flüssigkeitszusätze oder trockene Katzenleckerlis.
- Achten Sie auf unausgewogene Kalorien und/oder kontraindizierte Nährstoffe aus Leckereien, menschlicher Nahrung oder anderen Quellen.
- Bieten Sie der Katze soziale Kontakte durch Streicheln oder Pflegen an, bevor Sie ihr Futter anbieten, wenn dies für sie eine Belohnung darstellt.
- Wenn die Katze belohnt werden soll, sollte dies durch den Besitzer oder ein beliebtes Mitglied des tierärztlichen Teams erfolgen.
- In einer häuslichen Umgebung kann die Katze fressen, wann und wo der Besitzer gerade isst.

- Probieren Sie verschiedene Schüsselarten oder einen flachen Teller aus. Verwenden Sie immer eine Schüssel oder einen Teller, der leicht zu reinigen ist und keine Gerüche annimmt.
- Achten Sie auf die Frische der Lebensmittel, indem Sie sie in luftdichten Verpackungen aufbewahren.
- Füttern Sie häufiger kleinere Mahlzeiten, besonders bei Nassfutter.
- Erwärmen Sie die Lebensmittel sanft oder bringen Sie sie auf Raumtemperatur.

Die nächsten Schritte

Wenn diese Strategien nicht funktionieren, können Tierärzte den Einsatz eines appetitanregenden Mittels oder einer Ernährungssonde in Betracht ziehen, um den Energie- und Nährstoffbedarf der Katze zu decken. Ernährungssonden können dazu beitragen, das Problem der Nahrungsmittelabneigung zu vermeiden und eine angemessene Ernährung und Flüssigkeitszufuhr zu gewährleisten.

Beispiel: Langsame Futterumstellung versus schnelle Futterumstellung für Katzen. Angepasst durch Quimby 2023.³



Literaturangaben

1. Odunayo, A. (2023). Praktisches Tool: Assisted feeding and using feeding tubes in canine and feline practice. In C. Lenox, R. J. Corbee, & A. Sparkes (Eds.), *Purina Institute Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition* (2nd ed.). Embark Consulting Group.
2. Taylor, S., Chan, D. L., Villaverde, C., Ryan, L., Peron, F., Quimby, J., O'Brien, C., & Chalhoub, S. (2022). 2022 ISFM Consensus guidelines on management of the inappetent hospitalised cat. *Journal of Feline Medicine and Surgery*, 24(7), 614-640. doi: 10.1177/1098612X221106353
3. Quimby, J. (2023). Chronic kidney disease in cats. In C. Lenox, R. J. Corbee, & A. Sparkes (Eds.), *Purina Institute Handbook of Canine and Feline Clinical Nutrition* (2nd ed.). Embark Consulting Group.